

Caco-2细胞说明书

Cat NO.: CL-0050

1. 售前须知：

1. 细胞贴壁慢特别是刚复苏时，一般两到三天贴壁展开，会有空泡；2. 细胞在传代细胞中注意消散，不然难贴壁；3. 成片状生长，细胞密度越大，表面空泡黑点越多；4. 一般细胞长至80%传代，细胞成片，其实密度很大；5. 细胞生长太满对细胞状态影响严重，传代后易碎，死亡；6. 细胞生长时间越久，消化难度也会随之增加；消化到轻拍培养瓶侧边细胞可以滑落的时候可以终止。

2. 基本信息：

中文名称	人结直肠腺癌细胞
细胞简称	Caco-2
细胞别称	CaCo-2; CACO-2; Caco 2; CACO 2; CACO2; CaCo2; CaCO2; Caco2; Caco-2/ATCC
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁细胞
培养方案A(默认)	生长培养基：MEM (含NEAA) (PM150410) + 20% FBS(164210-50) + 1% P/S(PB180120) 培养条件：气相：空气，95%；CO ₂ ，5%；温度：37
冻存条件	55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 液氮
传代步骤	1. 吸出原培养液； 2. 加入2mL左右PBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞，吸出PBS丢弃； 3. 加入1mL左右0.25%胰蛋白酶溶液（含EDTA），轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞； 4. 放入培养箱消化，显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止，全程不要拍打培养瓶； 5. 加入3mL含血清的培养基终止消化，吹打细胞使之脱壁并在液体里反复吹打使细胞尽量呈单颗细胞的悬浮液； 6. 收集细胞悬液离心，1200rpm/min 3分钟，离心完吸出上清丢弃；



7.加入新鲜培养基，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。

消化时间	3-5min
传代比例（密度）	1:3-1:4
换液频次	2-3次/周

3. 参考资料(来源文献)：

细胞背景描述	Caco-2细胞分离自直肠原位癌；当长到满时，Caco-2细胞表现出特征性的肠上皮细胞分化。Caco-2细胞表达维甲酸结合蛋白I和维甲酸结合蛋白II，并呈角质蛋白阳性。
倍增时间	~60-80 hours
年龄（性别）	男性；72岁
组织来源	结肠，结直肠腺癌
细胞类型	肿瘤细胞
肿瘤类型	肠癌细胞
生物安全等级	BSL-1
致瘤性	Yes, in nude mice; forms moderately well differentiated adenocarcinoma consistent with colonic primary (grade II).
受体表达	This cell line expressed heat stable enterotoxin (Sta, E. coli) and epidermal growth factor (EGF).
基因表达	keratin, retinoic acid binding protein 1, retinol binding protein 2
细胞保藏中心	ATCC; HTB-37 BCRJ; 0059 DSMZ; ACC-169 ECACC; 09042001 ECACC; 86010202

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞株技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及相应售后条款参见《细胞售后条例》。

收到常温细胞后如何处理？



(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们的技术支持交流。

发表[中文论文]请标注：Caco- 2 (CL-0050)由武汉普诺赛生命科技有限公司提供；

👍 发表[英文论文]请标注：Caco- 2 (CL-0050) were kindly provided by Wuhan Pricella Biotechnology Co.,Ltd.

