

VK2/E6E7细胞说明书

Cat NO.: CL-1024

1. 基本信息：

中文名称	人阴道上皮细胞
细胞简称	VK2/E6E7
细胞别称	Vk2/E6E7; VK-2/E6E7; VK2 (E6/E7); VK2
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁细胞
培养方案A(默认)	生长培养基：VK2/E6E7细胞专用培养基(CM-1024) 培养条件：气相：空气，95%；CO ₂ ，5%；温度：37
冻存条件	55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 液氮
传代步骤	1.吸出原培养液； 2.加入2mL左右PBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞,吸出PBS丢弃； 3.加入1mL左右0.25%胰蛋白酶溶液（含EDTA），轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞； 4.放入培养箱消化，显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止，全程不要拍打培养瓶； 5.加入3mL含血清的培养基终止消化，吹打细胞使之脱壁并在液体里反复吹打使细胞尽量呈单颗细胞的悬浮液； 6.收集细胞悬液离心，1200rpm/min 3分钟，离心完吸出上清丢弃； 7.加入新鲜培养基，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。
消化时间	5-7min
传代比例（密度）	1:3-1:6
换液频次	2-3次/周

2. 参考资料(来源文献)：

细胞背景描述 VK2/E6E7 是一种上皮细胞系，于1996年从一位因子宫内膜异



位症而接受子宫切除术的 32 岁女性患者的粘膜中分离出来。

倍增时间	~24 hours
年龄（性别）	女性；32岁
组织来源	阴道粘膜
细胞类型	转化细胞系
细胞应用	可以为研究宫颈阴道生理学和感染以及测试阴道内应用的药物制剂提供有效的、可重复的体外模型的基础。
生物安全等级	BSL-1
基因表达	细胞角蛋白8 (CK8)、10 (CK10)、13 (CK13)、18 (CK18)、19 (CK19)；巨噬细胞集落刺激因子；转化生长因子 1；白细胞介素8；前列腺素E2；分泌性白细胞蛋白酶抑制剂；聚合免疫球蛋白受体。
细胞保藏中心	ATCC; CRL-2616

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞株技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及相应售后条款参见《细胞售后条例》。

收到常温细胞后如何处理？

（细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》）

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们的技术支持交流。



发表[中文论文]请标注：VK2/E6E7 (CL-1024)由武汉普诺赛生命科技有限公司提供；
发表[英文论文]请标注：VK2/E6E7 (CL-1024) were kindly provided by Wuhan Pricella Biotechnology Co.,Ltd.

普诺赛® | Pricella
Procell

普诺赛® | Pricella
Procell

普诺赛® | Pricella
Procell

普诺赛® | Pricella
Procell

