

# 人主动脉内皮细胞(原代永生化)

Cat NO.: CP-H080Y

## 一、产品简介

1. 产品名称:人主动脉内皮细胞(原代永生化)

2. 组织来源:主动脉组织

3. 细胞简介:

人主动脉内皮细胞(原代永生化)是原代人主动脉内皮细胞经慢病毒转染的方式携带 SV40T基因,经抗生素和传代筛选获得。人主动脉内皮细胞分离自主动脉组织;主动脉是体循环的动脉主干。其运行路径为:升主动脉起于左心室,至右侧第2胸肋关节高度移行为主动脉弓,弓行向左后至第4胸椎体下缘移行为降主动脉;在第12胸椎体高度穿膈的主动脉裂孔移行为腹主动脉,以上为胸主动脉,至第4腰椎体下缘分为左、右髂总动脉;髂总动脉在骶髂关节高度分为髂内、外动脉。主动脉内皮细胞是覆盖在主动脉内面的单层细胞,可分泌一系列血管活性物质而保持血管稳态,当其受到炎症或其它因素刺激后稳态被破坏而导致一些心血管疾病的发生。因此,主动脉内皮细胞已成为研究心血管疾病发病机制及治疗药物不可缺少的工具。内皮细胞或血管内皮是一薄层的专门上皮细胞,由一层扁平细胞所组成。它形成血管的内壁,是血管管腔内血液及其他血管壁(单层鳞状上皮)的接口。内皮细胞是沿着整个循环系统,由心脏直至最小的微血管。

# 4. 方法简介:

普诺赛实验室分离的人主动脉内皮细胞(原代永生化)是原代人主动脉内皮细胞经慢病毒转染的方式携带SV40T基因,经抗生素和传代筛选获得,细胞总量约为 $5\times10^5$  cells/瓶。

## 5. 质量检测:

普诺赛实验室分离的人主动脉内皮细胞(原代永生化)经CD31免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

#### 6. 培养信息:

携带基因 SV40T、Puro

培养基 含FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin等

产品货号 CM-H080Y

换液频率 每2-3天换液一次

生长特性 贴壁

细胞形态 内皮细胞样

传代特性 可传3-5代左右;3代以内状态最佳

传代比例 1:2

消化液 Accutase消化液

培养条件 气相:空气,95%;CO<sub>2</sub>,5%

网站: <u>www.procell.com.cn</u> 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋





Rev. V1.0



人主动脉内皮细胞(原代永生化)体外培养周期有限;建议使用普诺赛配套的专用生 长培养基及正确的操作方法来培养,以此保证该细胞的最佳培养状态。

#### 二、细胞培养状态

发货时发送细胞电子版照片

# 三、使用方法

人主动脉内皮细胞(原代永生化)是一种贴壁细胞,细胞形态呈内皮细胞样,在普诺 赛 技术部标准操作流程下,细胞可传3-5代左右;3代以内状态最佳;建议您收到细胞后尽快进行 相关实验。

客户收到细胞后,请按照以下方法进行操作。

1. 取出T25细胞培养瓶,用75%酒精消毒瓶身,拆下封口膜,放入37、5%CO2、饱和湿度 的细胞培养箱中静置3-4h,以稳定细胞状态。

# 2. 贴壁细胞消化

- 1)吸出T25细胞培养瓶中的培养基,用PBS清洗细胞一次;
- 2)添加Accutase消化液1mL至T25培养瓶中,轻微转动培养瓶至消化液覆盖整个培养瓶底 后,37 温浴1-3min;倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后,再加入5mL完全培养基终 止消化;
- 3)用吸管轻轻吹打混匀,按传代比例接种T25培养瓶传代,然后补充新鲜的完全培养基至 5mL, 置于37、5% CO2、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养;
- 4)待细胞完全贴壁后,培养观察,用于实验;之后再按照换液频率更换新鲜的完全培养 基。

## 3. 细胞实验

因原代细胞贴壁特殊性,贴壁的原代细胞在消化后转移至其他实验器皿(如玻璃爬片、培 养板、共聚焦培养皿等)时,需要对实验器皿进行包被,以增强细胞贴壁性,避免细胞因 没贴好影响实验;包被条件常选用鼠尾胶原  $(2-5 \mu g/cm^2)$ ,多聚赖氨酸PLL(0.1 mg/ml)) , 明胶(0.1%) , 依据细胞种类而定。悬浮/半悬浮细胞无需包被。

#### 四、注意事项

- 1. 培养基于4 条件下可保存3个月。
- 2. 在细胞培养过程中,请注意保持无菌操作。
- 3. 消化过程中,胰酶消化时间不宜过长,否则会影响细胞贴壁及其生长状态。
- 4. 建议客户收到细胞后前3天每个倍数各拍几张细胞照片,记录细胞状态,便于和普诺赛技 术部沟通;由于运输的原因,个别敏感细胞会出现不稳定的情况,请及时和我们联系,详 尽告知细胞的具体情况,以便我们的技术人员跟踪、回访直至问题得到解决。
- 5.该细胞只可用干科研。

网站: www.procell.com.cn 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋







# 特殊注意事项

6. 第一次传代建议1:2进行,消化时间不要太久,避免细胞发生死亡。

备注:由于实验所用试剂、操作环境及操作手法的不同,以上方法仅供各实验室参考

网站: www.procell.com.cn 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



